

Nemasys® Multi mot insekter i trädgården

Skadegörare	Utrustning/ applicering	10 miljoner räckes till	När behandla	Hur ofta	Att tänka på
Morotsfluganslarv	Använd vattenkanna med en grovstril eller tryckspruta, och grov sprutdusch.  Applicera som en riklig vattning av rötterna, då blir effekten på skadegöraren bäst.	Upp till 60m <sup>2</sup>	April till juli. Efter plantering, upprepa var 14:e dag under växt-säsongen så länge skadegörare finns.	Behandling var 14:e dag	Behandling längs med raderna och runt plantorna. Larverna är intill plantornas stjälkar och rötter.
Kålfluganslarv					
Bandflylarver					
Lökfluganslarv					
Harkrankslarver	Behandla på fuktig jord och vattna väl efter behandling.	Upp till 60m <sup>2</sup>	April till juli. Efter plantering, upprepa var 14:e dag under växt-säsongen så länge skadegörare finns.	Upprepad behandling behövs för att få önskad effekt.	Behandla hela jordytan.
Sorgmyggor					Före kommer mest i växthus, behandla jord på marken, i krukor, odlingsäckar.
Myror					Myror tolererar inte nematoder nära sitt bo och flyttar sitt bo från området.
Larver av olika insekter	Använd en tryckspruta och grov sprutdusch.	Upp till 60 m <sup>2</sup>	Behandla när skadegöraren är synlig. Överväg behandling varje vecka fram till att skadegörarens livscykel är över.	3 behandlingar rekommenderas, så alla skadegörarens livscykel skall vara genomförd.	Viktigt att sprutvätskan får kontakt med skadegöraren!
Krusbärsstekel	Spruta direkt på skadegöraren på växten. Skadegörare som inte blir träffade vill inte bli kontrollerade.				
Trips	Fukta området som skall behandlas innan. Undvik direkt solljus.				
Äppelvecklare	Använd en tryckspruta och grov sprutdusch.  Stam, lågt sittande grenar och jord under trädet behandlas. Fukta ytan som skall behandlas innan.	Upp till 16 träd	Behandla under september/ oktober. Behandla med en veckas mellanrum.	3 behandlingar behövs för att täcka perioden som äppelvecklare lämnar trädet	Denna behandling påverkar stadier av övervintrande äppelvecklare och ger en påverkan på nästa års äppelvecklare.

**Notera:** Tidpunkter vill variera beroende på område i landet och när skadegörare förekommer på/i friland, vävtäckta och växthuskulturer.